Когда у женщины нашли внематочную беременность, нужно действовать быстро. Лечение должно проводиться в минимальные сроки. Если запустить болезнь, то будут непоправимые последствия.

Когда у женщины диагностирована внематочная беременность, сроки лечения должны быть минимальными. Запущенный случай может обернуться непоправимыми последствиями.

Чаще всего такая беременность обусловлена нелеченым воспалительным процессом, протекающим в малом тазу. Среди причин, вызывающих патологическое явление, выделяют спаечный процесс. Он может начаться в послеоперационный период или стать результатом инфекционного заболевания.

В ряде случаев внематочная беременность развивается из-за наличия опухоли женских половых органов, а также их не совсем нормального развития. Маточные трубы неправильной формы могут существенно влиять на развитие внематочной беременности. Женщины, чья первая беременность завершилась абортом, находятся в группе риска и должны внимательно следить за состоянием репродуктивной системы.

Симптоматика

Сроки определения внематочной беременности волнуют многих женщин, подозревающих ее развитие в собственном организме. Наличие данной патологии очень опасно для здоровья женщины.

Внематочная беременность своими проявлениями похожа на обычную. Исключение составляют боли, появившиеся внизу живота. Они могут быть резкими или тянущими, а также сопровождаться выделениями крови. При внематочной беременности сроки разрыва трубы зависят от интенсивности развития оплодотворенного яйца. Чтобы разрыва не произошло, проблему нужно устранить в экстренном порядке.

Сроки диагностики внематочной беременности находятся в пределах 1 месяца (4 или 5 недель), при условии, что будет проведено трансвагинальное УЗИ. Ультразвуковой метод исследования позволит определить место, где плодное яйцо расположено. Кроме того, врач порекомендует провести анализ, определяющий уровень ХГЧ в крови пациентки. Его показатель при нормальной беременности выше, чем при развитии внематочной патологии.

Последствия

Матка начинает увеличиваться и приобретает размер шестинедельной беременности. Примерно на 7-й неделе может случиться самопроизвольное прерывание беременности. Это происходит, если плодное яйцо не закрепилось на стенке. В том случае, если оплодотворенная яйцеклетка смогла прикрепиться, выкидыш может произойти к концу первого триместра.

Сохранение фаллопиевых труб — желательная мера. Чтобы разрыва не произошло, диагностика внематочной беременности и сроки прерывания должны быть максимально ранними. Если медицинское обследование подтверждает наличие патологии, женщину в экстренном порядке госпитализируют в клинику, где врачи проводят комплекс мер по извлечению плодного яйца.